

# Teórico 6

## Diseño - Dependencias Funcionales



# Problemas de un Mal Diseño

- Repetición de información (potencial inconsistencia).
- Imposibilidad de representar información.



# Ejemplo

Supongamos que estamos trabajando con información de Personas y Vehículos, y dicha información está representada con una sola tabla.

R(DNI, NYApellido, Dir, Npat, Modelo, Marca)

Supongamos la siguiente instancia de la relación R:

DNI	NYApellido				
23	Juan Pere				
23	Juan Pere				
24	Carlos Pui				

Qué problemas se pueden apreciar ?

# Problemas del Diseño Anterior

- Las personas que no tienen ningún vehículo asociado no las puedo representar debido a que la clave primaria no admite valores nulos.
- Se repite la información de las personas que tienen más de un vehículo.



# Que Hacer ?

Las tablas que están mal diseñadas hay que dividir las en dos o más tablas.

Una posibilidad puede ser dividir  
R en Personas y Vehículos de la  
siguiente forma:

Personas (DNI, NYApellido,Dir, Modelo)

Y

Vehiculos (Npat, Modelo,Marca)



# Las Instancias Serían

## Personas

<b>DNI</b>	<b>NYApellido</b>		
23	Juan Peres		
23	Juan Peres		
24	Carlos Puig		

## Vehículos

<b>Npat</b>	<b>Modelo</b>	
NDT 454	2000	
KJI 566	2005	
GTR 654	2000	

Para que una división sea válida y no tenga pérdida de información, el join Natural entre las tablas de ser igual a la tabla original en cuanto a instancias.

$r = \text{personas} \bowtie \text{vehículos}$

En nuestro caso:  $\text{personas} \bowtie \text{vehículos} \neq r$

DNI	NYApellic				
23	Juan Pere				
23	Juan Pere				
23	Juan Pere				

# Por lo Tanto

- Debo buscar un método que me permita hacer una buena división.
- Como determino si llegue a un buen diseño?





# Dependencias Funcionales

- Son restricciones a los datos que puede admitir una base de datos.
- El concepto de dependencia funcional es una generalización del concepto de Clave.
- Las dependencias funcionales juegan un papel importante en el diseño de bases de datos.



# Superclave

## Definición:

Sea  $R$  un esquema de relación, se dice que un subconjunto  $K$  de  $R$  es una superclave de  $R$  si para todo par de tuplas  $t_1, t_2 \in r(R)$  tales que  $t_1 \neq t_2$  entonces  $t_1[k] \neq t_2[k]$

o de manera equivalente,

$t_1[k] = t_2[k]$  entonces  $t_1 = t_2$



# Dependencia Funcional

## Definición:

• Sea  $R$  un esquema de relación y sean  $\alpha \subseteq R$  y  $\beta \subseteq R$ , la dependencia funcional

$\alpha \rightarrow \beta$  (se lee “ $\alpha$  determina  $\beta$ ”)

se cumple en  $R$ , si para cualquier instancia  $r(R)$  se cumple que para todo par de tuplas

$t_1, t_2 \in r$ , si  $t_1[\alpha] = t_2[\alpha]$  entonces  $t_1[\beta] = t_2[\beta]$

# Ejemplo

1) Dada  $R(A,B)$  con instancia  $r(R)$

A	B
1	2
2	2
3	3

Por ej. Vale  $A \rightarrow B$  y no Vale  $B \rightarrow A$

2) Dada  $R(A,B,C)$  con instancia  $r(R)$

A	B	C
1	1	1
2	2	2
3	2	2
2	2	3

Por ej. Vale  $A \rightarrow B$  y  $C \rightarrow B$  y no Vale  $C \rightarrow A$



# Definiciones

- Sea  $K \subseteq R$ ,  $K$  es una superclave para el esquema  $R$  si y sólo si:  $K \rightarrow R$ .
- Sea  $K \subseteq R$ ,  $K$  es una clave candidata para  $R$  si y sólo si:
  - $K \rightarrow R$ , y
  - No existe un  $\alpha \subset K$  tal que  $\alpha \rightarrow R$
- Las dependencias funcionales permiten expresar restricciones que no pueden ser expresadas mediante superclaves.

# Dependencia Funcional (Cont.)

- Una dependencia funcional es trivial si es satisfecha por todas la instancias de una relación.
  - E.j.
    - DNI, NYApellido  $\rightarrow$  DNI
    - NYApellido  $\rightarrow$  NYApellido
  - En general,  $\alpha \rightarrow \beta$  es trivial si  $\beta \subseteq \alpha$

# Clausura de un Conjunto de Dependencias Funcionales

- A partir de un conjunto de dependencias funcionales  $F$  se puede probar que valen otras. Se dice que estas dependencias funcionales están implicadas lógicamente por  $F$ .

# Ejemplo

Dado un esquema  $R=(A,B,C)$  donde valen las dependencias funcionales  $A \rightarrow B$  y  $B \rightarrow C$ , se puede probar que  $A \rightarrow C$  también vale:

Para todo par de tuplas  $t_1, t_2$  de  $r$ , tales que  $t_1[A] = t_2[A]$

Dado que vale  $A \rightarrow B$  entonces se cumple que  
 $t_1[B] = t_2[B]$

Además como vale  $B \rightarrow C$  se cumple que  
 $t_1[C] = t_2[C]$

De esta forma queda probada la validez de  $A \rightarrow C$



# Definición de $F^+$

Sea  $F$  un conjunto de dependencias funcionales que valen en un esquema  $R$ , la clausura de  $F$ , denotado  $F^+$ , es el conjunto de dependencias funcionales implicadas por  $F$ .



# Axiomas de Armstrong

- Para simplificar el cálculo de  $F^+$ , evitando la utilización de la definición de dependencia funcional para obtener nuevas dependencias, se pueden utilizar un conjunto de reglas llamadas Axiomas de Armstrong.

# Axiomas de Armstrong (Cont)

Para las siguientes reglas se utilizan letras griegas ( $\alpha, \beta, \gamma$ , etc) para notar conjuntos de atributos y se utiliza  $\alpha\beta$  para notar  $\alpha \cup \beta$ :

- Reflexividad

si  $\beta \subseteq \alpha$ , entonces  $\alpha \rightarrow \beta$

- Aumentación

si  $\alpha \rightarrow \beta$  y  $\gamma$  es un conjunto de atributos, entonces  $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$

- Transitividad

si  $\alpha \rightarrow \beta$ , y  $\beta \rightarrow \gamma$ , entonces  $\alpha \rightarrow \gamma$

Estas reglas son correctas porque no generan dependencias incorrectas y son completas porque para un F dado permiten generar todo  $F^+$ .



# Axiomas de Armstrong(Cont)

- Para simplificar más el cálculo de  $F^+$  se ofrecen más reglas que pueden ser probadas utilizando los Axiomas de Armstrong:

- **Unión**

Si se cumple  $\alpha \rightarrow \beta$  y  $\alpha \rightarrow \gamma$ , entonces se cumple  $\alpha \rightarrow \beta \gamma$

- **Descomposición**

Si se cumple  $\alpha \rightarrow \beta \gamma$ , entonces se cumple  $\alpha \rightarrow \beta$  y  $\alpha \rightarrow \gamma$

- **Seudotransitividad**

Si se cumple  $\alpha \rightarrow \beta$  y  $\gamma \beta \rightarrow \delta$ , entonces  $\alpha \gamma \rightarrow \delta$

# Ejemplo

Dado  $R=(A,B,C,D)$   $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$

Algunas dependencias de  $F^+$  son:

- Por transitividad de  $A \rightarrow B$  y  $B \rightarrow C$  tenemos:

$A \rightarrow C$

- Por aumentación de  $A \rightarrow B$  con  $D$  tenemos:

$AD \rightarrow BD$

# Clausura de Conjuntos de Atributos

- Dado un conjunto de atributos  $\alpha$ , se define la clausura de  $\alpha$  bajo  $F$  (denotado por  $\alpha^+$ ) como el conjunto de atributos que son determinados funcionalmente por  $\alpha$  bajo  $F$ :

$$\alpha \rightarrow \beta \text{ está en } F^+ \iff \beta \subseteq \alpha^+$$

- Algoritmo para computar  $\alpha^+$  bajo  $F$

```
resultado :=  $\alpha$ ;  
while (cambia resultado) do  
  for each dependencia  $\beta \rightarrow \gamma$  in  $F$  do  
    begin  
      if  $\beta \subseteq \text{resultado}$   
        then resultado := resultado  $\cup \gamma$   
    end
```

# Ejemplo de Clausura de Atributos

- *Dados*  $R = (A, B, C, G, H, I)$  y
$$F = \{A \rightarrow B$$
$$A \rightarrow C$$
$$CG \rightarrow H$$
$$CG \rightarrow I$$
$$B \rightarrow H\}$$
- Calcular  $(AG)^+$ 
  1. *resultado* =  $AG$
  2. *resultado* =  $ABCG$  ( $A \rightarrow C$  y  $A \rightarrow B$ )
  3. *resultado* =  $ABCGH$  ( $CG \rightarrow H$  y  $CG \subseteq AGBC$ )
  4. *resultado* =  $ABCGHI$  ( $CG \rightarrow I$  y  $CG \subseteq AGBCH$ )
- $AG$  es una clave candidata?
  1.  $AG$  es superclave?
    1. Vale  $AG \rightarrow R$ ?
  2. Algún subconjunto de  $AG$  es superclave?
    1. vale  $A^+ \rightarrow R$ ?
    2. vale  $G^+ \rightarrow R$ ?

# Uso de la Clausura de Conjunto de Atributos

El algoritmo de clausura de un conjunto de atributos tiene varios usos:

- Prueba para superclaves:
  - Para probar si  $\alpha$  es una superclave, computar  $\alpha^+$  y chequear si  $\alpha^+$  contiene todos los atributos de  $R$ .
- Probar la validez de una dependencia funcional:
  - Para chequear si una dependencia funcional  $\alpha \rightarrow \beta$  vale, debe chequearse si  $\beta \subseteq \alpha^+$ .
  - Esto es computar  $\alpha^+$  utilizando la clausura de atributos, y luego chequear si la clausura contiene a  $\beta$ .
- Computar la clausura de F:
  - Para cada  $\gamma \subseteq R$ , definir la clausura  $\gamma^+$ , y para cada  $S \subseteq \gamma^+$ , generar la dependencia funcional  $\gamma \rightarrow S$ .





# Recubrimiento Canónico

- Los conjuntos de dependencias funcionales pueden tener dependencias redundantes que se pueden deducir de las otras:
  - Ej:  $A \rightarrow C$  es redundante en:  $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$
  - Parte de una dependencia funcional puede ser redundante
    - Ej. de redundancia en la parte derecha  
 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow CD\}$  puede ser simplificado a  
 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D\}$
    - Ej. de redundancia en la parte izquierda :  
 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, AC \rightarrow D\}$  puede ser reducido a  
 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D\}$
- Intuitivamente, un recubrimiento canónico de  $F$  es un conjunto “mínimo” de dependencias funcionales equivalente a  $F$ , sin dependencias o partes de dependencias redundantes.

# Atributos Extraños

- Considere el conjunto de dependencias funcionales  $F$  y una dependencia funcional  $\alpha \rightarrow \beta$  en  $F$ :
  - El Atributo  $A$  es **extraño** en  $\alpha$  si  $A \in \alpha$  y  $F$  implica lógicamente a  $(F - \{\alpha \rightarrow \beta\}) \cup \{(\alpha - A) \rightarrow \beta\}$ .
  - El Atributo  $A$  es **extraño** en  $\beta$  si  $A \in \beta$  y el conjunto de dependencias  $(F - \{\alpha \rightarrow \beta\}) \cup \{\alpha \rightarrow (\beta - A)\}$  implica lógicamente a  $F$ .
- Ej.: Dado  $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, AC \rightarrow D\}$ 
  - $C$  es extraño en  $AC \rightarrow D$  porque  $F$  implica lógicamente a  $A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \rightarrow D$ .  
Se prueba aumentando con  $A$  y transitividad
- Ej.: dado  $F = \{A \rightarrow C, AB \rightarrow CD\}$ 
  - $C$  es extraño en  $AB \rightarrow CD$  porque  $\{A \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$  implica lógicamente a  $F$ .  
se prueba con la regla de UNION entre otras...

# Prueba si un Atributo es Raro

- Considere un conjunto  $F$  de dependencias funcionales y la dependencia  $\alpha \rightarrow \beta$  in  $F$ .
- Para probar si el Atributo  $A \in \alpha$  es extraño en  $\alpha$ 
  1. computar  $(\{\alpha\} - A)^+$  utilizando las dependencias en  $F$ .
  2. chequear que  $(\{\alpha\} - A)^+$  contiene a  $\beta$ ; si es así,  $A$  es extraño.
- Para probar si el atributo  $A \in \beta$  es extraño en  $\beta$ 
  1. computar  $\alpha^+$  utilizando sólo las dependencias en  $F' = (F - \{\alpha \rightarrow \beta\}) \cup \{\alpha \rightarrow (\beta - A)\}$ ,
  2. chequear que  $\alpha^+$  contiene a  $A$ ; si es así,  $A$  es extraño

# Recubrimiento Canónico

- Un *recubrimiento canónica* para  $F$  es un conjunto de dependencias  $F_c$ , tal que:
  - $F$  implica lógicamente todas las dependencias en  $F_c$ , y
  - $F_c$  implica lógicamente todas las dependencias en  $F$ , y
  - Ninguna dependencia en  $F_c$  contiene atributos extraños, y
  - Cada lado izquierdo de las dependencias en  $F_c$  es único.
- Para computar un recubrimiento canónico para  $F$ :  
**repeat**
  - Usar la regla de unión para reemplazar las dependencias in  $F$   
 $\alpha_1 \rightarrow \beta_1$  y  $\alpha_1 \rightarrow \beta_2$  con  $\alpha_1 \rightarrow \beta_1 \beta_2$
  - Encontrar una dependencia funcional  $\alpha \rightarrow \beta$  con un atributo extraño en  $\alpha$  o en  $\beta$
  - Si se encuentra algún atributo extraño, eliminarlo de  $\alpha \rightarrow \beta$**until**  $F$  no cambie

Nota: La regla de Unión debería ser aplicada después de que algunos atributos extraños han sido eliminados.

# Ejemplo

- Dado  $R = (A, B, C)$  y  
 $F = \{A \rightarrow BC$   
 $B \rightarrow C$   
 $A \rightarrow B$   
 $AB \rightarrow C\}$
- Combinar  $A \rightarrow BC$  y  $A \rightarrow B$  en  $A \rightarrow BC$ 
  - El conjunto queda  $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, AB \rightarrow C\}$
- $A$  es extraño en  $AB \rightarrow C$  porque  $B \rightarrow C$  implica lógicamente  $AB \rightarrow C$ .
  - Luego el conjunto es  $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow C\}$
- $C$  es extraño en  $A \rightarrow BC$  porque  $A \rightarrow BC$  es implicado lógicamente por  $A \rightarrow B$  y  $B \rightarrow C$ .
- El recubrimiento canónico es:

$$A \rightarrow B$$
$$B \rightarrow C$$